

SORICIDE DB

SORICIDE DB est un appât rodenticide hydrofuge de couleur rose contenant 0.005% de Difénacoum. Il est destiné à la lutte contre les rats et les souris dans et autour des bâtiments. Composé à base d'un mélange de céréales et de paraffine de qualité alimentaire, il est particulièrement bien consommé par les principaux rongeurs, y compris en concurrence alimentaire

ACTION

Les anticoagulants permettent de ne pas éveiller la méfiance des rongeurs (relation entre l'ingestion de l'appât et la mort de leur congénères) car les premiers signes cliniques n'apparaissent que plusieurs jours après l'ingestion de l'appât.

Délai de l'apparition de l'effet biocide : 3 à 7 jours après consommation.

Délai moyen du traitement : 6 à 8 semaines en fonction de l'infestation

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Déposer les appâts dans des postes d'appâtage (boîtes) sécurisés et inviolables. Placer ces boîtes aux endroits fréquentés par les rongeurs (près des nids, des sites de nourriture, aux passages et aux autres endroits où l'animal gîte).

Contrôler régulièrement les boîtes afin de vérifier la consommation. Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâtage une fois par semaine durant la période de traitement. Les rongeurs morts doivent être retirés régulièrement. Les appâts souillés doivent être remplacés car ils ne seront plus consommés.

Tout bloc partiellement consommé doit être remplacé par un bloc neuf, jusqu'à l'arrêt complet de la consommation.

Utilisation en intérieur et aux abords des bâtiments :

Rats : 80 g à 200 g d'appât par poste (4 à 8 blocs), espacer les postes de 15 mètres.

Souris : de 25g à 30 g d'appât (1 bloc). Espacer les postes de 3 mètres

Adapter la quantité de produit à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application. Le nombre de boîtes est fonction du site à traiter, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.



Produit biocide : TP14

AMM :

Professionnels:

FR-2012-002

Grand public:

FR-2012-050

Contient

0.005% Difénacoum (m/m)

Benzoate de dénatonium (amérisant)

Type :

Appât prêt à l'emploi sous forme de bloc moulé

Durée de conservation :

2 ans

Conditionnements :

Pour les Professionnels, en carton de 10 kg :

28g à trou

50g à trou

70g plaquette

70g plaquette œillets

80g à œillet

ZA de Kerampaou

29140 MELGVEN

Tel. 02 98 59 57 57


Fax. 02.98 59 55 47

larc@wanadoo.fr

BR00011



SORICIDE DB



Produit biocide : TP14

AMM :

Professionnels:

FR-2012-002

Grand public:

FR-2012-050

Contient

0.005% Difénacoum (m/m)

Benzoate de dénatonium (amérisant)

Type :

Appât prêt à l'emploi sous forme de bloc moulé

Durée de conservation :

2 ans

Conditionnements :

Pour les Professionnels, en carton de 10 kg :
28g à trou
50g à trou
70g plaquette
70g plaquette œillets
80g à œillet

PRECAUTIONS

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Après le travail et avant les repas, se laver les mains et la peau exposée.

Empêcher l'accès aux appâts par les enfants ainsi que par les animaux domestiques et les oiseaux.

Stockage :

Stocker le produit dans un endroit ventilé et frais à l'écart des odeurs (solvants, insecticides,...) . Le garder hermétiquement fermé en lieu sûr.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Élimination :

L'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Éliminer les cadavres de rongeurs conformément à la législation.


ANTIDOTE

L'antidote des anticoagulants est la vitamine K1. L'administration de l'antidote doit se faire sous contrôle médical.

EFFETS SECONDAIRES DÉFAVORABLES

Les symptômes les plus importants d'intoxication par ingestions sont : épistaxis et saignements au niveau des muqueuses buccales, apparition d'hématomes multiples ou étendus, hémorragies, sang dans les urines, augmentation du temps de coagulation.

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. ».



LARC

ZA de Kerampaou

29140 MELGVEN

Tel. 02 98 59 57 57

Fax. 02.98 59 55 47

larc@wanadoo.fr

BR00011